Révision De Géométrie

1) Droites, demi-droites et segments

<p><u>Droites:</u></p> <p>Droite (D) ou (AB) ou (BA)</p> <p>Droite (xy) ou (yx)</p>	<p><u>Demi-droites:</u></p> <p>Origine de la demi-droite [Ox)</p> <p>Demi-droites [Au) et [Av)</p>	<p><u>Segments:</u></p> <p>Segment [AB] ou [BA]</p> <p>A et B sont ses extrémités</p> <p>Sa longueur est AB</p>
---	--	---

2) Positions relatives de deux droites

<p><u>Droites concourantes:</u></p> <p>(xy) et (uv) sont des droites concourantes en point A</p> <p>A est un point commun des droites (xy) et (uv)</p>	<p><u>Droites parallèles:</u></p> <p>(xy) et (uv) sont parallèles.</p> <p>On écrit (xy) // (uv)</p> <p>(xy) et (uv) n'ont aucun point commun</p>	<p><u>Droites confondues:</u></p> <p>(xy) et (uv) sont confondues</p> <p>Tous leurs points sont communs</p>
--	--	---

3) Droites parallèles et perpendiculaires

<p><u>Propriété (1):</u></p> <p>Une seule droite (uv) peut être menée du point A et parallèle à (xy).</p>	<p><u>Propriété (2):</u></p> <p>Une seule droite (uv) peut être menée par le point A et perpendiculaire à (xy).</p>	<p><u>Projeté orthogonal</u></p> <p>Distance de A à la droite (xy) est égale à AH</p> <p>Point H est le projeté orthogonal du point A sur la droite (xy). Ou on dit: H est le pied de la perpendiculaire menée de A à la droite (xy).</p>
<p><u>Propriété (3):</u></p> <p>Si deux droites sont parallèles à une même troisième, donc elles sont parallèles elles.</p> <p>Si (xy) // (zt) et (uv) // (zt), donc: (xy) // (uv).</p>	<p><u>Propriété (4):</u></p> <p>Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, donc elles sont parallèles entre elles.</p> <p>Si (xy) ⊥ (zt) et (uv) ⊥ (zt), donc: (xy) // (uv).</p>	<p><u>Propriété (5):</u></p> <p>Si deux droites sont parallèles, toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre.</p> <p>Si (xy) // (uv) et (zt) ⊥ (xy), donc: (zt) ⊥ (uv).</p>

4) Angles et Droites

On donne $(xy) \parallel (uv)$; (zt) est une sécante coupant (xy) en A et (uv) en B.

- ✓ $\widehat{A}_3 + \widehat{A}_2 = 180^\circ$; $\widehat{A}_1 + \widehat{A}_4 = 180^\circ$; $\widehat{B}_1 + \widehat{B}_4 = 180^\circ$; etc. (angles supplémentaires).
- $\widehat{A}_3 + \widehat{B}_2 = 180^\circ$; $\widehat{A}_4 + \widehat{B}_1 = 180^\circ$ sont dites angles internes du même côté.
- ✓ $\widehat{A}_1 = \widehat{A}_3$; $\widehat{A}_2 = \widehat{A}_4$; $\widehat{B}_1 = \widehat{B}_3$; $\widehat{B}_2 = \widehat{B}_4$ (angles opposés par le sommet).
- ✓ $\widehat{A}_4 = \widehat{B}_2$; $\widehat{A}_3 = \widehat{B}_1$. (angles alternes-internes).

- ✓ $\widehat{A}_3 = \widehat{B}_3$; $\widehat{A}_4 = \widehat{B}_4$; $\widehat{A}_2 = \widehat{B}_2$; $\widehat{A}_1 = \widehat{B}_1$ (angles correspondants).

On donne deux droites (xy) et (uv) ; (zt) est une secante coupant (xy) en A et (uv) en B.

- ✓ Si deux des angles alternes-internes sont égaux, donc $(xy) \parallel (uv)$.
Exemples: Si $\widehat{A}_4 = \widehat{B}_2$ ou $\widehat{A}_3 = \widehat{B}_1$; donc $(xy) \parallel (uv)$.
- ✓ Si deux des angles correspondants sont égaux, donc $(xy) \parallel (uv)$.
Exemples: Si $\widehat{A}_3 = \widehat{B}_3$ ou $\widehat{A}_4 = \widehat{B}_4$ ou $\widehat{A}_2 = \widehat{B}_2$ ou $\widehat{A}_1 = \widehat{B}_1$; donc $(xy) \parallel (uv)$.

5) La médiatrice d'un segment

On donne: (d) est la médiatrice du segment $[AB]$.

Donc:

Propriété (1): (d) est perpendiculaire à $[AB]$ en son milieu M.

Propriété (2): Tout point I appartient à la médiatrice (d) du segment $[AB]$, est équidistant de ses extrémités A et B c.à.d. $IA = IB$.

On donne: $[AB]$ est un segment, et I est un point tel que $IA = IB$.

Propriété: Tout point I équidistant des extrémités A et B d'un segment $[AB]$, appartient à sa médiatrice (d) .

A et B sont les extrémités de $[AB]$

6) La bissectrice d'un angle

On donne: $[Oz)$ est la bissectrice de l'angle $\widehat{xOy}$.

Donc:

Propriété (1): $[Oz)$ partage $\widehat{xOy}$ en deux angles adjacents égaux:

$$\widehat{xOz} = \widehat{zOy} = \frac{\widehat{xOy}}{2}$$

Propriété (2): Tout point I appartient à la bissectrice $[Oz)$ de l'angle $\widehat{xOy}$, est équidistant de ses côtés $[Ox)$ et $[Oy)$, c.à.d. $IA = IB$.

On donne: un angle $\widehat{xOy}$, point A est sur $[Ox)$, point B est sur $[Oy)$, et I est un point tel que: $(IA) \perp [Ox)$ en A, $(IB) \perp [Oy)$ en B et $IA = IB$.

Propriété: Tout point I équidistant des côtés $[Ox)$ et $[Oy)$ d'un angle $\widehat{xOy}$, appartient à sa bissectrice $[Oz)$.

$[Ox)$ et $[Oy)$ sont les côtés of $\widehat{xOy}$

7) Triangles

a. Types des triangles:

Triangle isocèle

ABC est un triangle isocèle:

- ✓ A est son sommet principal,
- ✓ $AB = AC$,
- ✓ $[BC]$ est sa base,
- ✓ $\widehat{ABC} = \widehat{ACB}$, sont ses angles à la base.

- [AM] est une:
- ✓ médiane,
 - ✓ altitude,
 - ✓ bissectrice de l'angle $\widehat{BAC}$
 - ✓ et médiatrice de [BC].

Triangle équilatéral

[AM], [BN] et [CP] sont:

- ✓ médianes,
- ✓ altitudes,
- ✓ bissectrices des angles
- ✓ et médiatrices des côtés.

ABC est un triangle équilatéral:

- ✓ $AB = AC = BC$,
- ✓ $\widehat{BAC} = \widehat{ABC} = \widehat{ACB} = 60^\circ$.

Triangle rectangle

ABC est un triangle rectangle en A, [AM] est la médiane relative à l'hypoténuse [BC]. Donc:

- ✓ $\widehat{ABC} + \widehat{ACB} = 90^\circ$.
- ✓ $AM = \frac{BC}{2}$.
- ✓ $MA = MB = MC$.
- ✓ M est le centre du cercle (C) circonscrit au triangle ABC. Son diamètre est [BC].
- ✓ $BC^2 = AB^2 + AC^2$ (théorème de Pythagore).

On donne un triangle ABC, et M est le milieu de [BC].

Donc ABC est un triangle rectangle en A si une des conditions

- suivantes est satisfaite: ✓ $\widehat{BAC}$ est un angle droit. ✓ $AM = \frac{BC}{2}$.
- ✓ $AB^2 + AC^2 = BC^2$ (Réciproque du théorème de Pythagore).
 - ✓

Triangle rectangle isocèle

Triangle demi-équilatéral

- $AC = \frac{BC}{2}$ (Côté opposé à 30°)
- $AB = \frac{BC\sqrt{3}}{2}$ (Côté opposé à 60°)

b. Droites remarquables dans un triangle:

Hauteurs (Altitudes)

H: Orthocentre
Point d'intersection des hauteurs

Médianes

G: Centre de gravité
Point d'intersection des médianes

Bissectrices

I: centre du cercle inscrit
Point d'intersection des bissectrices

Médiatrices

I: centre du cercle circonscrit
Point d'intersection des médiatrices

$$AG = \frac{2}{3} AM ; GM = \frac{1}{3} AM ; GM = \frac{1}{2} AG$$

c. Cas d'égalité (deux triangles quelconques):

d. Cas d'égalité (deux triangles rectangles):

8) **Le théorème des milieux**

a. Trapèze: Un trapèze est un quadrilatère ayant exactement deux côtés parallèles.

Comment démontrer qu'un trapèze est rectangle?

Démontrer que:

- ✓ un de ses angles est droit.

Comment démontrer qu'un trapèze est isocèle?

Démontrer une des conditions suivantes:

- ✓ Les angles adjacents à une des bases sont égaux.
- ✓ Les côtés non-parallèles sont égaux.
- ✓ Les diagonales sont égales.
- ✓ Les bases ont la même médiatrice.

b. Théorème des milieux dans un triangle:

Propriété (1):

Dans un triangle ABC, si:

- ✓ M est le milieu de [AB] et
- ✓ N est le milieu de [AC]. Donc: $(MN) \parallel (BC)$ et $MN = \frac{BC}{2}$.

Propriété (2):

Dans un triangle ABC, si:

- ✓ M est le milieu de [AB] et
- ✓ (MN) est parallèle à [BC], où N est sur [AC]. Donc: N est le milieu de [AC].

c. Théorème des milieux dans un trapèze:

Propriété (1):

Dans un trapèze ABCD, si:

- ✓ M, N, P et Q sont les milieux de [AD], [BC], [BD] et [AC] respectivement.

Donc: $(MN) \parallel (AB) \parallel (CD)$; $MN = \frac{AB + CD}{2}$; $PQ = \frac{CD - AB}{2}$

9) Quadrilatères

a. Propriétés:

	Parallélogramme	Rectangle	Losange	Carré

Côtés	Côtés opposés sont = et //	Côtés opposés sont = et //	Côtés opposés sont // + Quatre côtés sont =	Côtés opposés sont // + Quatre côtés sont =
Angles	Angles opposés sont = et angles adjacents sont supplémentaires	Quatre angles sont droits	Angles opposés sont = et angles adjacents sont supplémentaires	Quatre angles sont droits
Diagonales	Se coupent en leur milieu	sont égaux et se coupent en leur milieu	sont $\perp$ et se coupent en leur milieu	sont $\perp$, égaux et se coupent en leur milieu
Centre de symétrie	① point d'intersection des diagonales	① point d'intersection des diagonales	① point d'intersection des diagonales	① point d'intersection des diagonales
Axes de symétrie	Aucune	② médiatrices des côtés opposés	② supports des diagonales	④ supports des diagonales + $\perp$ médiatrices des côtés opposés

b. Comment démontrer?

<p><u>Comment démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme?</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ les côtés opposés sont parallèles. ✓ les côtés opposés sont égaux. ✓ deux côtés opposés sont égaux et parallèles. ✓ les diagonales se coupent en leur milieu. ✓ Les angles opposés sont égaux. ✓ le point d'intersection des diagonales, est un centre de symétrie. 	<p><u>Comment démontrer qu'un quadrilatère est un rectangle?</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ trois angles sont droits. ✓ les diagonales se coupent en leur milieu et sont égaux. ✓ le quadrilatère est un parallélogramme, plus <u>un</u> des suivants: <ul style="list-style-type: none"> ■ un angle est droit. ■ diagonales sont égaux.
<p><u>Comment démontrer qu'un quadrilatère est un losange?</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ quatre côtés sont égaux. (D'après la définition) ✓ les diagonales se coupent en leur milieu et perpendiculaires. ✓ Les supports des diagonales sont des axes de symétrie. ✓ le quadrilatère est un parallélogramme, plus <u>un</u> des suivants: <ul style="list-style-type: none"> ■ deux côtés consécutifs sont égaux. ■ les diagonales sont perpendiculaires. ■ les diagonales sont bissectrices de ses angles. 	<p><u>Comment démontrer qu'un quadrilatère est un carré?</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ quatre côtés sont égaux et un angle est droit. ✓ les diagonales sont égaux, perpendiculaire et se coupent en leur milieu. ✓ les diagonales sont égaux, se coupent en leur milieu et sont les bissectrices de ses angles. ✓ le quadrilatère est un losange plus <u>un</u> des suivants: <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 angle droit. ■ diagonales sont égaux. ✓ le quadrilatère est un rectangle plus <u>un</u> des suivants: <ul style="list-style-type: none"> ■ 2 côtés consécutifs sont égaux. ■ diagonales sont $\perp$. ✓ le quadrilatère est un parallélogramme, plus <u>un</u> des suivants: <ul style="list-style-type: none"> ■ 2 côtés consécutifs sont égaux et 1 angle est droit. ■ diagonales sont $\perp$ et égaux.

10) Cercles

a. Positions relatives d'un point et d'un cercle

- A est sur (C), donc: $OA = r$.
- E est intérieur à (C), donc: $OE < r$.
- F est extérieur à (C), donc: $OF > r$.

Diamètre [AB] est une corde passant par l'origine O

- ✓ Cercle $C(O; r)$.
- ✓ [OA], [OB], [OD] sont des rayons de (C).
- ✓ [BD] est une corde de (C).
- ✓ [AB] est un diamètre de (C).
- ✓ O est un centre de symétrie de (C), tandis que (d) est un axe de symétrie de (C).

Si $OA = r$, donc A est sur (C).

Si $OE < r$, donc E est intérieur à (C).

Si $OF > r$, donc F est extérieur à (C).

b. Positions relatives de deux cercles:

Cercles extérieurs (Disjoints extérieurs)

Dans tous les cas, la ligne des centres (OO') est un axe de symétrie de la figure formée par les deux

Cercles intérieurs (Disjoints intérieurs)

Cercles tangents extérieurement

Cercles tangents intérieurement

Cercles sécants

c. Arcs et angles:

$$\widehat{xOy} = m. \widehat{AB}$$

$$\widehat{xDy} = \frac{m. \widehat{AB}}{2}$$

$$\widehat{xAB} = \frac{m. \widehat{AB}}{2}$$

$$\widehat{AFB} = \frac{m. \widehat{AB} + m. \widehat{DE}}{2}$$

$$\widehat{AFB} = \frac{m. \widehat{AB} - m. \widehat{DE}}{2}$$

$$\widehat{ADB} = 90^\circ$$

On dit un angle inscrit dans un demi-cercle.

$$\text{Longueur de l'arc } \widehat{AB} = \frac{\pi r \times \alpha^\circ}{180^\circ}$$

$$\text{Aire du secteur circulaire } AOB = \frac{\pi r^2 \times \alpha^\circ}{360^\circ}$$

11) Comment démontrer trois points sont alignés?

- ✓ Trois points distincts sont dits **alignés**, s'ils sont placés sur la **même** droite.
- ✓ Si A, B et C (dans cet ordre) sont alignés, donc:
 - $AC = AB + BC$.
 - $\widehat{ABC}$ est un angle plat ou $\widehat{ABC} = 180^\circ$.

✓ Pour démontrer trois points A, B et C dans cet ordre sont alignés, utiliser une des méthodes suivantes:

Démontrer que:
 $AB + BC = AC$

Démontrer que:
 $\widehat{ABC}$ est un angle plat ou
 $\widehat{ABC} = 180^\circ$.

Démontrer que:
B est le milieu du segment [AC] s'il est possible.

On donne une droite (xy).

Démontrer que:
 $(AB) // (xy)$
et $(BC) // (xy)$.

Si : $(xy) // (uv)$;
A est sur (xy);
et C est sur (uv);

Démontrer que:
 $\overline{xAB} = \overline{vCB}$
ou $\overline{yAB} = \overline{uCB}$.

Si : B est sur la droite (xy);

Démontrer que:
 $\overline{ABx} = \overline{CBx}$
ou $\overline{ABx} = \overline{CBx}$.

On donne: D, E et F sont sur la droite (xy);
et un point O n'est pas sur (xy).

Démontrer que:
A, B et C sont les images de D, E et F symétriquement par rapport à O respectivement.

On donne: D, E et F sont sur la droite (xy);
et une droite (d).

Démontrer que:
A, B et C sont les images de D, E et F symétriquement par rapport à (d) respectivement.